


Indicativos de risco aumentado de exposição ao HIV

- Solicitação ou desejo de usar PrEP.
- Repetição de práticas sexuais anais ou vaginais sem uso de preservativo ou com uso inconsistente de preservativo.
- Frequência das relações sexuais com parcerias eventuais.
- Quantidade e diversidade de parcerias sexuais.
- Histórico de episódios de infecções sexualmente transmissíveis (IST).
- Busca repetida de profilaxia pós-exposição (PEP).
- Contexto de relações sexuais em troca de dinheiro, objetos de valor, drogas, moradia.
- *Chemsex*: prática sexual sob a influência de drogas ou substâncias psicoativas para facilitar ou melhorar as experiências sexuais.
- Compartilhamento de agulhas, seringas ou outros equipamentos para injetar drogas.
- Parcerias com situação desconhecida sobre o HIV e que apresentem qualquer um dos fatores acima.



CV-HIV: exame de carga viral do HIV; PrEP: profilaxia pré-exposição; PEP: profilaxia pós-exposição; TR HIV: teste rápido de HIV; TR2: segundo teste rápido de HIV.
* Se houver histórico de doença renal previamente conhecida ou fatores de risco para doença renal (hipertensão arterial sistêmica, diabetes, uso de medicamentos nefrotóxicos), o resultado de creatinina deve ser avaliado antes do início da PrEP.